

予防接種スケジュール

標準的な接種期間は病気にかかりやすい時期を考慮して定められた期間です。予防接種実施医療機関にご相談の上、接種を受けましょう。対象年齢期間を過ぎると有料になりますので、ご注意ください。

※①～⑤は、接種間隔の間違いが起こりやすい予防接種です。前ページを参考に注意してください。

■ 標準的な接種期間 □ 対象年齢

予防接種の種類	接種回数	2か月	3か月	6か月	9か月	10か月	11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	対象年齢	間隔	
① ロタ	ロタリックス®(1価)	2回	■	■																						生後6週以上24週未満 ※1回目は生後14週6日後まで	2回目:27日以上
	ロタテック®(5価)	3回	■	■	■																						生後6週以上32週未満 ※1回目は生後14週6日後まで
②B型肝炎	3回	■	■	■																						12か月未満	2回目:27日以上 3回目:1回目から139日以上
③小児用肺炎球菌※	初回:3回 追加:1回	■	■	■				■																		2か月以上5歳未満	初回:27日以上 追加:初回接種終了後60日以上かつ1歳以上
④DPT-IPV-Hib五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)	1期初回:3回 1期追加:1回	■	■	■				■																		2か月以上7歳6か月未満	初回:20日以上 追加:初回接種終了後6か月以上
DT二種混合 (ジフテリア・破傷風)	2期:1回																									11歳以上13歳未満	
BCG	1回	■	■																							12か月未満	
MR (麻しん・風しん混合)	1期:1回 2期:1回							■																		1期:1歳以上2歳未満 2期:小学校就学の1年前(5歳以上7歳未満)	
水痘(みずぼうそう)	2回							■	■																	1歳以上3歳未満	3か月以上
⑤日本脳炎	1期初回:2回 1期追加:1回 2期:1回																									1期:6か月以上7歳6か月未満 2期:9歳以上13歳未満	1期初回:6日以上 1期追加:初回接種終了後6か月以上
HPV	サーバリックス®(2価)	3回																								小学6年生から高校1年生相当	2回目:1か月以上 3回目:1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上
	ガーダシル®(4価)	3回																								小学6年生から高校1年生相当	2回目:1か月以上 3回目:2回目から3か月以上
	シルガード®9(9価)	3回																								小学6年生から高校1年生相当	2回目:1か月以上 3回目:2回目から3か月以上 (1回目接種時に15歳未満の場合は5か月の間隔を置いて2回でも可)
おたふくかぜ(任意接種)	2回							■																		1歳以上就学前 ※1人1回の接種費用助成あり ※接種は1歳と就学前の2回を推奨	

※接種開始時期や接種時の年齢などにより接種回数が異なります。詳しくは「予防接種と子どもの健康」でご確認ください。
 (注1)麻しん・風しん・水痘(みずぼうそう)・おたふくかぜなどにかかったお子さまは、次の予防接種までに4週間程度の間隔が必要です。
 (注2)DT二種混合2期、日本脳炎2期の予防票は、小学校から配布されます。